**A CARBOSAN GÉL AZ AJAKFÁJDALMAK – PL. LÁZ KIVÁLTOTTA, HERPESZVÍRUS OKOZTA GYULLADÁS –, VALAMINT SZÁJNYÁLKAHÁRTYA-FEKÉLY TÜNETEINEK ENYHÍTÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY.**

- **Segít a herpesz, afta, ajakfájdalmak enyhítésében**
- **Elősegíti a természetes gyógyulási folyamatot**
- **Gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszer**
- **Átlátszó gél, diszkrét kezelést biztosít**

**ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ, A FELHASZNÁLÁS MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA**
A készítmény szokásos adagja: a géllel naponta 4 alkalommal vastagon kell bekenni az érintett bőr-, ill. szájnyálkahártya felületet, lehetőleg étkezések után és lefekvéskor. A gélt az ajakfájdalom vagy szájüregi fekély első tüneteinek jelentkezésekor (bizsergés vagy égő érzés) célszerű alkalmazni, és a lehető legtovább kell az érintett területen hagyni.

**FIGYELMEZTETÉS**
**A gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztató ismerteti a gél alkalmazhatóságát gyermekkorban, terhességben; alkalmazhatóságát más gyógyszerekkel együtt és milyen fennálló betegségben kerülendő a használata.**

**KÉSZÍTMÉNY HATÓANYAG**
A készítmény hatóanyaga: 20,8 mg karbenoxolon-nátrium grammonként.

**GYÁRTÓ ÉS JOGTULAJDONOS**
**Rowa Pharmaceuticals Ltd. Newtown Bantry, Co.Cork Írország**

**FORGALMAZÓ**
**Satco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Tel.: (+36-1) 371-0530 • Fax: (+36-1) 371-0531
e-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu
www.carbosan.hu

ROWA® Pharmaceuticals Ltd., Bantry, Co. Cork, Ireland.
sAtco

**HERPESZ, AFTA, AJAKFÁJDALMAK TÜNETEINEK ENYHÍTÉSÉRE!**

# carbosan GÉL

**SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT GÉL**
**5 g**
karbenoxolon-nátrium

**Átlátszó gél, diszkrét kezelést biztosít**

ROWA® 1959–2019

**A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!**

**Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!**

carbosan GÉL
SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT GÉL
5 g
karbenoxolon-nátrium

# Afta

## MEGJELENÉS

fehér színű, fájdalmas fekélyek,
a szájüregben (íny, ajkak belső fele, nyelv alatt)

## HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZŐK

- szájüregi sérülések
- hiányállapotok
  diéta, vitamin hiány, gyenge immunrendszer
- ételallergia/ érzékenység
- stressz
- hormonális változások
- öröklődő hajlam

## JELLEGZETES TÜNETEK

- **fehér színű, fájdalmas fekélyek a szájüregben**
  (íny, ajkak belső fele, nyelv alatt)
- **akadályozhatja**
  a beszédet és az étkezést

## KEZELÉS CARBOSAN GÉLLEL

Ha a panasza nem javul 1–2 héten belül, forduljon orvoshoz!

**A tünetek enyhítésére és fájdalomcsillapításra használja a Carbosant.**

- naponta 4 alkalommal
- vastagon bekenve
- étkezések után

**AZ AFTA NEM FERTŐZŐ!**

## MEGELŐZÉS

1. **Savas, fűszeres ételek, magvak kerülése**
   (pl. dió)
2. **Megfelelő szájhigiénia**
   (az erős dörzsölés és a kemény sörtéjű fogkefe kerülése)
3. **Sérülést okozó ételek kerülése**
   (chips, magvak, kétszersült)



carbosan GÉL
SZÁJNYÁLKAHÁRTYÁN ALKALMAZOTT GÉL
5 g
karbenoxolon-nátrium

# Herpesz

## MEGJELENÉS

folyadékkal teli hólyagok,
idővel kifakadnak és varasodnak

## KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

- betegsé-gek, láz
- erős nap-sugárzás
- stressz
- menstruáció
- hormonális tényezők
- pszichés tényezők
- gyógyszerek

## JELLEGZETES TÜNETEK

Az ajkakon megjelenő hólyagok kísérő tünete lehet:

- **láz**
- **fájdalom**
- **nyirok-csomó duzzanat**
- **általános betegségérzet, levertség**

## KEZELÉS CARBOSAN GÉLLEL

Kb. egy hét alatt spontán gyógyul.

**Ha a tünetek nagyon súlyosak, láz vagy komplikáció, felülfertőződés, gennyesedés lép fel, forduljon orvoshoz.**

- naponta 4 alkalommal
- vastagon bekenve
- étkezések után

## HOGYAN TERJED A HERPESZ?

A vírus cseppfertőzéssel terjed, a testi kontaktus (tüsszentés, csók, herpesszel fertőzöttek utáni pohárhasználat) bőven elég az átadás-átvételéhez.

## MEGELŐZÉS

1. **Immunrendszer erősítése**
   az egészséges életmód, sport és a kiegyensúlyozott táplálkozás erősíti az immunrendszert, ezen keresztül megakadályozza a herpesz előtörését.
2. **Fényvédelem**
   nyáron magas faktorszámú napvédő szerek használata (ajkak és szájkörnyék bekenése).
3. **A kontaktus kerülése**
   mellőzze a fertőzött személyekkel való érintkezést, ne használjon közös poharat, evőeszközt, törölközőt.
4. **Higiénia**
   mindig mosson kezet, kiváltképp, miután megérintette a fertőzött területet.